



INSTITUTE OF ADVANCED GASTROENTEROLOGY

Especialista en enfermedades digestivas, hígado, páncreas y facturación.

Gastroduodenoscopia Esófago-Instrucciones:

3 DIAS (72 hours) ANTES DEL PROCEDIMIENTO, DETENGA, POR FAVOR Aspirina, diluyentes de la sangre (como Plavix, Coumadin, etc) y AINE (como Ibuprofeno, Motrin, Advil, Naproxyn, Aleve, Fish oil y medicamentos similares, etc). Si tiene algún problema para suspender estos medicamentos, consulte a su médico de cabecera. Su procedimiento tendrá que ser reprogramado, si estos medicamentos no son detenidos.

1 DIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Dieta ligera durante El día.
- Pasando la medianoche nada de comer or tomar.
- No tome antiácidos líquidos 24 horas antes del procedimientos

EN EL DIA del procedimiento:

- Tome todos los medicamentos recetados (menos los medicamentos anotados arriba) con pequeños sorbos de agua.
- Puede tomar sorbos de líquido claro 5 horas antes de la hora de la cita (vea la parte posterior de la hoja pa sugerencias).
- **Debe tener un conductor** (adulto responsable) que lo lleve de regreso a su casa y se quede con usted las próximas 24 horas. No conduzca ni maneje maquinaria, firme documentos legales ni reanude la actividad habitual hasta el día siguiente después del procedimiento. Si no tiene un conductor, su procedimiento tendrá que ser reprogramado.
- No use pintura de uñas o loción el día de su procedimiento.
- Se le dará una hora de llegada el día antes del procedimiento, y su procedimiento comenzará aproximadamente 2 horas después de su llegada, ya que este tiempo es necesario para completar todos los trámites y la evaluación y preparación preoperatoria.
- Planee estar allí aproximadamente de 4 a 5 horas. Esto puede cambiar día a día dependiendo de la complejidad de los casos Para ese Día. **Por favor, asegúrese de informar a su conductor.**
- Tenga en cuenta que muchos pacientes están siendo atendidos en el centro quirúrgico. Es posible que se le solicite a su médico que pase más tiempo con pacientes que tienen problemas de salud y necesidades especiales. Por lo tanto, su procedimiento puede retrasarse. Es posible que desee traer un libro u otro elemento para mantenerlo ocupado mientras espera
- **Por favor, traiga una lista de todos sus medicamentos para la prueba.**

** Si toma sedantes, narcóticos, tranquilizantes y medicamentos antipsicóticos el día o el día anterior al procedimiento, entonces es su responsabilidad dar la lista junto con las dosis al procedimiento Enfermera o el Doctor de lo contrario, pueden interferir y causar complicaciones con los medicamentos administrados durante el procedimiento.**

****PACIENTES DIABÉTICOS:**** El día del procedimiento tome la mitad de sus medicamentos habituales (insulina/pastillas).

*****Si siente que necesita más azúcar, tome 2-4 cucharadas de azúcar o mezcle el azúcar con 2-3 onzas de agua y bébalo. Puede tomar azúcar hasta 2 horas antes de su hora de llegada si es necesario.*****

¡Por favor, asegúrese de NO llevar joyas u otros artículos valiosos con usted! Asegúrese de traer su copago el día de su procedimiento. Si tiene que llevar dinero en efectivo para su copago, asegúrese de pagar cuando llegue y todos los demás artículos personales (efectivo, cartera, billetera, etc.) se dejan en casa o se deben entregar a su transporte si decide llevarlos con usted. . No seremos responsables de ningún artículo perdido.

Descripción: Durante este procedimiento, solo se evaluará el esófago, el estómago y posiblemente parte del intestino delgado.

Fecha del Procedimiento: _____
Si tiene alguna pregunta y / o problema, llámenos @ 323-1200 Mon-Fri 8:30am-5:00pm.

Advanced Endoscopy Center @ 9802 Stockdale Hwy, Ste. 101 (661) 616-5300 or (661) 323-1200 (La instalación lo llamará un día hábil antes de su procedimiento para la hora de llegada. Si no recibe llamada antes de las 3:00 p.m., llame al 323-1200).

***** De **scargo de responsabilidad:** Estas son instrucciones generales de preparación y no están destinadas a reemplazar el consejo de su médico o proveedor de atención médica. Le recomendamos que consulte con su médico de atención primaria (PCP) antes de seguir estas instrucciones, si tiene alguna pregunta o inquietud especial.